



Négret ponchut

Vass3R12s026-030



Collection Vassal-Montpellier

442Mtp2

*95-144*  
*Negrette ponchut*  
*Clos 3 R 12 A 26-30*

*Negrette Ponchut*

*95144*



















Désignation : Négrette Pouchet

Clos Planche 9 Côté S N° 144

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité :

12-8-57

P: 0

S. 1 - mort

S. 2 - 2

S. 3 - mort

S. 4 - mort

S. 5 - 0.

1<sup>e</sup> époque

Désignation : Négrette Pouchet

Clos Planche 9 Côté S N° 144

Vigueur : 2

Date de maturité : 12-8-57 P: 0

Charge :

S. X  
Mortis 2 2  
X  
4 2  
5 4

Désignation : Négrette Pouchet

Clos Planche 9 Côté S N° 144

Vigueur : 2

Charge :

S. 1

8

2

3

4

5

631-559

P: 0

7

7

8

7

Désignation : Négrette Pouchet

Clos Planche 9 Côté S N° 144

Vigueur : 2

Date de maturité

16-8-60

Charge :

S.

1

2

3

4

5

7

0

0

4

5

P: 0

Nénette Ponchut.

Année 1958

N° . . . . . Planche 95144 Côté . . . . .

	Nombre total	18-3	21-3	26-3	D A T E S									
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5	1	2	4	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

couleur

De 24-3-58.  
IIe

Nénette Ponchut

Année 1959

N° . . . . . Planche 98144 Côté . . . . .

	Nombre Total	16-3	18-3	21-3	D A T E S									
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	1	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Couleur

De 20-3-59



Année : 1960  
N° . . . . . Planche . 25144.

N<sup>o</sup> . . . . . Planche . 25144 . Côté . . . . .

# Planche

Côte

	Nombre total	D A T E S					
		12-3	16/3				
1	5	4	3				
2	4	2	3				
3	4	1	3				
4	4	0	2				
5	5	2	3		Ole	15-3-60x	



Désignation : *Negrette ponchut*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *144* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*.  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
*0 dures*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

- 3<sup>e</sup> feuille verte.*  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

*Truel*



Désignation :

VASSAL                      Planche 9    Côté S    N° 144    Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) *bords révoqués*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) *1<sup>er</sup> l.* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Tinct 10-5-57*



*faible*  
26 MAI 1955

N° ordre

Désignation :

VASSAL      Planché *Negrette ponchut* 9 côté S N° 144 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*Murru Boutin  
floral*

*BReul  
13.6.56*



N° ordre

Désignation :

VASSAL      Planche 9 côté S      N° 144 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (5).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (5).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquay



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 9

côté S

N° 44

souche 1. 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 7.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 8.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 7.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 8.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brach.  
28.6.56



N° ordre

Désignation

*Negrette pouchut*

VASSAL

planche

9

côté

3

N°

144

souche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) *29* - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (2) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement (9).
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8).
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bloch* 20 JUIL 1956



N° ordre

Désignation

*Neoprette fouchet.*  
VASSAL planche 9 côté S N° 144 souche 1 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ nervures: glabre 4 - sétueux ⑤  
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéaux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*J. Guinet* 20 JUIL 1956

*7-7-56 Rouquier*

Pan de Baies

N° d'ordre

Désignation *Negrette ponchut*

VASSAL planche 9 côté 5 N° 144 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*Obane*

*23.8.57*

*~~Black 14.9.58~~*



Dénomination *Negundo paribut*.....

Planche .....*9*..... côté .....*S*.... Rang ..*144*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- feuille*
- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
- Mérithalle de longueur moyenne : *5...10* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Leghenny*

*26-11-57*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Nénette poushant* . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *9 S 144* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3)
- 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3)
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

*Tout 57*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Negrette Pouchet* . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. *9.5.144.* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . ~~(1)~~ - (2)  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.  
 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - (2) - (3).  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5).  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
 Forme : (4) - 5.  
 Médiane/Base : 6 - ~~(7)~~ - (8).

*Touquet*

**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001

Observateur :

Code cépage : 0442

Code clone : 02

Nom cépage : Négret pointu N

Emplacement : 3 R12 + 26.30

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. *Botrytis* grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	11	6-3	9-3		
2	21	9-3	9-3		
3	21	13-3	13-3		
4	21		23-3		
5	6	9-3	13-3		
Moyenne			13.3.01		

+9

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)



005

Formulaire de description 2/8  
(floraison)

Année : 2001

Observateur : TD

Code cépage : H42

Code introduction : 02

Nom introduction : Négret poignée N

Emplacement : 3 R2A 26.20

Bourgeonnement

oiv 001 **forme** : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente 1 - en liseré 2 - partout 3

oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 **couleur face supérieure** (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

**Profil** : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

**Densité poils dressés face inf.** : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

**Densité poils couchés face inf.** : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204

**Densité poils dressés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

**Densité poils couchés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Couleur face sup.** : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1<sup>re</sup> feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> feuille détachée sera notée : .....)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

**Profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

**Densité poils dressés face inf.** : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

**Densité poils couchés face inf.** : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225

**Densité poils dressés nervures face inf.** : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

**Densité poils couchés nervures face inf.** : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.

**Densité poils dressés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

**Densité poils couchés face sup.** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

**Couleur face sup.** : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.



CEE

Formulaire de description 3/8  
(floraison)

Année : 2001

Observateur : TD

Code cépage : 442 Code introduction : 02

Nom introduction : Négret pointu N

Emplacement : 3 R2s 26-30

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9.

oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyannique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) 1 - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2.

oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1<sup>o</sup> inflorescence : jusqu'au 4<sup>o</sup> noeud 1 - au-delà du 4<sup>o</sup> noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4.

oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 - ~~autres~~ 3.

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4.

Bouton floral : petit 1 - moyen 2 - gros 3.



**Formulaire de description 4/8**  
(entre nouaison et véraison)

Année : 2001

Observateur : TD

Code cépage : 442

Code introduction : 02

Nom introduction : Négret pointu N

Emplacement : 3 R12 A26 30

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7oiv 070 **pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.oiv 071 **pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure** : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I ou II) : absente 1 - présente 2oiv 072 **gaufre limbe** (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1 - présente 2oiv 075 **cloque face supérieure limbe** (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 2oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 2

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

[ sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U-accol.-V / dent = oui-non / dégarni - non-parfois-oui ]

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

**Densité poils couchés limbe face supérieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

**Densité poils dressés limbe face supérieure** :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 **Couleur du pétiole** : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1.



**Formulaire de description 5/8**  
(maturité)

Année: ~~2001~~ 2002

Observateur TD

Code cépage: 442

Code introduction: 02

Nom introduction: Negret pinte N

Emplacement 3 R12, 26-30

Grappe

oiv 202 **longueur**: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 - longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 8

oiv 203 **largeur**: très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5 - large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 6

oiv 204 **compacité**: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 **longueur pédoncule**: très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 - long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. 3,5

oiv 207 **lignification du pédoncule**: base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208\* **forme**: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3.

oiv 209\* **présence d'un aileron**: absent 1 - une à trois ailes 2 - plus de trois ailes 3

Baie

oiv 220 **longueur**: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 18

oiv 221 **largeur**: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 14

oiv 222 **uniformité de la grosseur**: non uniforme 1 - uniforme 3.

oiv 223 **forme**: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 **couleur épiderme**: vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6

oiv 226 **uniformité couleur épiderme**: non uniforme 1 - uniforme 2.

oiv 227 **pruine**: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 228 **épaisseur pellicule**: très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 **ombilic**: peu apparent 1 - apparent 2.

oiv 230\* **coloration de la pulpe**: non colorée 1 - colorée 2.

oiv 231 **intensité coloration pulpe**: non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 **succulence pulpe**: peu juteuse 1 - juteuse 2.

oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies): faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 **fermeté pulpe**: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9

oiv 236 **saveur**: aucune 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5

oiv 238 **longueur pédicelle**: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 10

oiv 240 **séparation du pédicelle**: très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 **présence de pépins**: absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 242 **longueur pépins**: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7

oiv 243 **poids d'un pépín** (moyenne de 100 pépins secs): très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins**: absentes 1 - présentes 2

Vassal: 000-11 grappe: **axe de la rafle**: non coloré 2 - coloré 1.

000-18 **région ombilicale**: déprimée 1 - non déprimée 2.

Millerandage: nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9



CEE

**Formulaire de description 6/8**  
(après chute des feuilles)

Année : 2001

Observateur : TD

Code cépage : 442

Code introduction : 02

Nom introduction : Négrer pointu N

Emplacement : 3 R2, 26-30

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.oiv 351 **vigueur** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 100

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 10

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.**Pruine sur sarment** : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

Formulaire de description 6/8  
(après chute des feuilles)

Année : 2002

Code cépage 442

Code introduction 02

Nom introduction Négret Pointe N

Observateur TD

Emplacement 3R12 D26-30

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 2 - aplatie 5

oiv 102 surface : lisse 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 2 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 2 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 353 longueur entrenœuds : très courts (< 60mm) 1 - courts (60-90mm) 3 - moyen (90-120mm) 5

longs (120-150mm) 7 - très longs (> 150mm) 9

Valeur absolue 110

oiv 354 diamètre entrenœuds : très petit (< 5mm) 1 - petit (5-8mm) 3 - moyen (8-11mm) 5

grand (11-14mm) 7 - très grand (> 14mm) 9

Valeur absolue 12

Porte greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal :

Nœuds : aplatis 1 - saillants 2 - saillants 3

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3